

UN AVVERTIMENTO DELLA FDA A CONFERMA CHE FARMACI PER ADHD CAUSANO MORTE IMPROVVISA, ATTACCHI CARDIACI E PARALISI, SEGNA IL 22ESIMO AVVERTIMENTO INTERNAZIONALE SUGLI PSICOFARMACI REGISTRATO QUEST'ANNO.

Nonostante i poteri forti dell'industria della salute mentale continuino a sminuire i rischi documentati dei farmaci per l'ADHD, l'autorità statunitense per i farmaci (FDA) ha infine stabilito che il pubblico ha il diritto di essere informato sui rischi mortali di questi psicofarmaci. L'FDA ha ordinato che la loro etichetta debba dichiarare che possono causare arresto della crescita, psicosi, aggressività e gravi effetti collaterali a livello cardiovascolare. La richiesta è arrivata a seguito d'un crescente movimento internazionale di dottori, personale medico, attivisti impegnati nel campo deirilasciate ai media, perché i rischi documentati associati all'assunzione di questi psicofarmaci fossero resi pubblici. Diritti umani e genitori che hanno a lungo lottato, tramite testimonianze rese a legislatori statali e federali e dichiarazioni. In febbraio, un comitato di consulenti dell'FDA ha raccomandato fortemente che le confezioni di tutti i farmaci per l'ADHD contengano un messaggio ben visibile e contornato di nero che evidenzi i rischi legati all'assunzione: attacco cardiaco, paralisi e morte improvvisa. In marzo un altro comitato s'è riunito per emanare alcuni avvisi aggiuntivi riguardo gli effetti collaterali di tipo psicologico. Precedentemente, sempre quest'anno, l'Australia aveva già lanciato un'inchiesta urgente riguardo la sicurezza di psicofarmaci per l'ADHD in seguito a 400 reazioni avverse accusate da bambini dai tre anni in su. Il Comitato dell'ONU sui diritti dei bambini, nel settembre del 2005, esprimeva preoccupazione sul fatto che l'ADHD e l'ADD "vengano erroneamente diagnosticati, con il risultato di una sovraprescrizione di farmaci psicostimolanti, nonostante le prove riguardanti gli effetti negativi di questi psicofarmaci siano sempre più numerose". Quattro di questi annunci s'indirizzano specificatamente ai potenziali effetti fatali a livello cardiovascolare. Solo nell'ultimo anno, vi sono stati dieci avvisi internazionali riguardo il fatto che i farmaci per ADHD possono causare suicidio, psicosi, allucinazioni e manie. Dodici avvertimenti sono stati pubblicati a livello internazionale sui pericoli degli antidepressivi, che comprendono suicidio, dipendenza, idee omicide, danni al fegato e attacchi cardiaci. Cinque di questi avvertimenti sugli antidepressivi menzionano i rischi per le donne incinte ed i loro neonati, includendo dipendenza dal farmaco per la madre e difetti per il neonato, quali malformazioni cardiache o danni letali ai polmoni. In Italia esistono da tempo diversi "centri autorizzati" dove vengono somministrati questi psicofarmaci e le scuole italiane sono già state "investite" da test a scopo diagnostico mentre gli insegnanti vengono convinti e addestrati a etichettare i bambini o a segnalare casi.

(fonte: www.cybermed.it, editing a cura della redazione "Giù le Mani dai Bambini")