



Curare L'Adhd con i farmaci? Prima controllare il cuore dei bambini
La posizione dell'American Heart Association sull'assunzione di farmaci contro la sindrome da deficit di attenzione e iperattività da parte dei bambini

ROMA - Prima di assumere farmaci contro la sindrome da deficit di attenzione e iperattività (Adhd) i bambini dovrebbero essere sottoposti a un elettrocardiogramma. Lo sostiene l'American Heart Association che, in un documento pubblicato su 'Circulation', sottolinea i rischi legati all'uso di questi medicinali, "che possono aumentare la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa". Dal 1999 al 2004, come riferisce il sito Fce News, su 26 bambini sono stati segnalati eventi cardiovascolari gravi quali ictus, arresto cardiaco o fibrillazioni. Sin dal 1999 la Food and Drug Administration, riferisce ancora l'American Heart Association, aveva chiesto alle case farmaceutiche di segnalare con chiarezza la possibilità di rischio cardiovascolare. Nel 2005 in Canada la prescrizione di anfetamine per questo tipo di disturbo fu sospesa in seguito alla morte improvvisa di alcuni bambini.

Il rischio è aumentato dal fatto che il disturbo comportamentale sembra particolarmente frequente proprio nei bambini cardiopatici rispetto alla popolazione generale. Secondo Victoria Vetter, prima firmataria del documento e professore di pediatria alla University of Pennsylvania School of Medicine di Philadelphia, si calcola che dal 33 al 42% dei bambini con malattie del cuore abbia anche difficoltà di attenzione o segni di iperattività. "Una ragione in più per accompagnare la diffusione di questi farmaci (su cui gravano anche altri effetti collaterali non trascurabili) con tutte le precauzioni possibili".

Fonte: superabile