



Farmaci per bimbi iperattivi, allarme dell'FDA: possono causare allucinazioni e danni al fegato

I farmaci per la sindrome ADHD, ovvero il disturbo da iperattività e deficit di attenzione, possono dare allucinazioni ai bambini. Alcuni hanno avuto la sensazione allucinatoria di vermi, serpenti e altri animali striscianti sul loro corpo.

A dimostrarlo uno studio direttamente effettuato dai ricercatori della Food and Drug Administration, l'organo regolatorio statunitense per i farmaci.

Diretto da Andrew Mosholder, lo studio è stato pubblicato sulla rivista *Pediatrics*. Secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters online, l'FDA ha analizzato i dati di 49 studi clinici riguardanti questa categoria di farmaci effettuati dai produttori; i farmaci esaminati sono stati il Ritalin della Novartis AG, il Focalin XR, i cerotti dermici Adderall XR e Daytrana della Shire Plc, Concerta della Johnson & Johnson, Strattera della Eli Lilly e Metadate CD della CoCelltech Pharmaceuticals Inc.

"Il numero di casi di psicosi o mania nei trial clinici pediatrici era basso", ha tranquillizzato Mosholder, ma comunque non trascurabile, "abbiamo notato infatti la completa assenza di simili eventi nel gruppo placebo di questi studi".

E un warning, un avvertimento dell'FDA, arriva più specificamente in merito allo Strattera, uno dei farmaci usati nella terapia dell'ADHD, in commercio anche in Italia, che provocherebbe danni al fegato. L'ente spiega così la sua decisione di mettere in guardia i medici sui possibili effetti tossici del farmaco: "mentre nella fase di pre-commercializzazione non erano stati evidenziati segnali circa possibili danni gravi al fegato, i report successivi alla commercializzazione hanno identificato nell'atomoxetina un elemento causante malattie epatiche, anche gravi e a volte mortali". Così l'FDA sollecita i medici a informare immediatamente le famiglie dei loro pazienti circa i rischi associati all'uso del medicinale, con preghiera "di contattare il proprio medico al primo sintomo di fatica, perdita di appetito, nausea, vomito, prurito, urine scure, ittero della pelle, gonfiore dell'area epatica o inspiegabili sintomi influenzali".

L'ADHD è un disturbo del comportamento che interessa bimbi in età scolare, caratterizzato da iperattività, problemi di concentrazione e nel relazionarsi con gli altri; in Usa milioni di bambini prendono farmaci per l'ADHD, una situazione che spesso ha suscitato il sospetto di eccessiva medicalizzazione di quel che potrebbe essere soltanto un eccesso di vivacità del bambino più che un vero disturbo.

Fonte: Panorama