



## **Bambini che utilizzano farmaci per l'ADHD: queste molecole possono essere un vero sedativo**

*di: By LINDSEY TANNER, AP Medical Writer – Mon Aug 24*

CHICAGO – Le chiamate ai centri antiveleno per i ragazzi che abusano di farmaci per il deficit di attenzione sono salite del 76% per i bambini sopra gli otto anni, e tale prova fa riflettere sulle pericolose conseguenze di un uso improprio della prescrizione, lo dimostra uno studio.

Le chiamate sono state effettuate da genitori preoccupati, da medici del pronto soccorso e da altri alla ricerca di consigli su come affrontare il problema, che può essere mortale. Ci sono stati quattro morti tra i casi valutati nello studio.

I bambini che prendono i farmaci per l'ADHD per aumentare le performance possono non rendersi conto che l'abuso di questi farmaci possono causare seri, a volte letali, sintomi permanenti, tra cui agitazione, tachicardia, pressione estremamente elevata.

"Dicono: è approvato dalla FDA, come potrebbe essere pericoloso?" Ha affermato Steve Pasierb, capo della Partnership for a Drug-Free America, con sede a New York. nello studio, i ricercatori del Centro Medico Infantile ospedaliero di Cincinnati hanno valutato i dati dal 1998 al 2005 dei Centri di controllo dell'Associazione americana di vigilanza. Durante quel periodo, le chiamate nazionali relative agli abusi da parte dei bambini di farmaci per l'ADHD, in particolare stimolanti, sono aumentate da 330 a 581 l'anno, e ci sono stati quattro morti. Complessivamente, il 42% dei ragazzi coinvolti avevano da moderati a gravi effetti collaterali e la maggior parte finì per ottenere un trattamento di pronto soccorso.

Il numero esatto degli adolescenti abusatori che hanno avuto effetti collaterali negativi è probabilmente molto più alto, perché molti casi non risultano nelle chiamate ai centri di pronto soccorso, ha detto l'autore dello studio il dottor Randall Bond, direttore medico del centro informativo per i farmaci e i veleni dell'ospedale.

L'aumento, dal 1998 al 2005, ha superato le chiamate per abuso di sostanze generiche per i giovani. C'è stato anche in parallelo un aumento dell'86 per cento in materia di prescrizioni di medicine per ADHD ai bambini dai 10 ai 19 anni, da circa 4 milioni a quasi 8 milioni in quel periodo.

"È una notizia negativa per un problema molto radicato", ha detto Pasierb. Ricerche del suo team suggeriscono che circa il 19% dei ragazzi hanno abusato di prescrizione di farmaci, comprese le medicine per il disturbo da deficit di attenzione/iperattività. Il nuovo studio è stato diffuso sul numero di agosto di Pediatrics. Mark Stein, un professore di psichiatria e esperto di ADHD presso l'Università dell'Illinois di Chicago, ha detto che gli abusi in genere comportano la rottura e l'assimilazione delle pillole polverizzate, che accelerano gli effetti e possono produrre un ronzio o un senso di euforia, insieme con pericolosi effetti collaterali. I bambini che sviluppano gravi effetti collaterali dovrebbero essere portati al pronto soccorso, dove dovrebbero essere usati sedativi per trattare il problema, ha detto Stein (...)