



## Farmaci: nuove precauzioni d'uso ed effetti indesiderati

Dopo il caso Vioxx, l'FDA ( Food and Drug Administration ) e l'EMA ( European Medicines Agency ) hanno rafforzato il sistema di farmacovigilanza postmarketing, con l'obiettivo di ridurre gli eventi avversi associati all'impiego dei medicinali. Ecco quindi alcune novità sul fronte delle molecole psicoattive.

### *Cessazione dell'abitudine al fumo*

Nei soggetti, che hanno assunto Champix (Vareniclina, in USA Chantix), un farmaco che trova indicazione nella cessazione dell'abitudine al fumo, sono stati riscontrati gravi sintomi neuropsichiatrici (cambiamento del comportamento, agitazione, umore depresso, ideazione suicidaria, e tentativo di suicidio o suicidio completato).

### *Depressione*

L'FDA ha ricevuto diverse segnalazioni di danno epatico per l'antidepressivo Cymbalta (Duloxetina), un SNRI. Sono stati riscontrati dolore addominale, epatomegalia, aumento dei livelli di transaminasi con o senza ittero. La Duloxetina può anche aggravare una sottostante malattia epatica.

La Paroxetina ( Eutimil, Seroxat, Sereupin ) è un antidepressivo SSRI, associato ad un'alta incidenza di reazioni da sospensione, rispetto ad altri antidepressivi della stessa classe.

Inoltre la Paroxetina appare associata a rischio di suicidabilità, soprattutto negli adolescenti e nei giovani adulti.

### *Disturbo bipolare & schizofrenia*

L'antipsicotico di prima generazione Aloperidolo ( Haldol, Serenase ) prolunga l'intervallo QT, favorendo la comparsa di torsioni di punta. Sono stati segnalati casi di morte improvvisa.

I farmaci antipsicotici atipici ( Abilify, Leponex, Risperdal, Seroquel, Zyprexa ) possono aumentare il rischio di iperglicemia.

L'Olanzapina (Zyprexa) appare essere associata ad un'elevata incidenza di aumento di peso e di insorgenza di diabete.

La Clozapina (Clozaril, Leponex) può causare agranulocitosi, ad esito talora fatale. Gli eventi avversi gastrointestinali della Clozapina sono potenzialmente gravi. La costipazione indotta dal farmaco può essere associata ad ostruzione intestinale, perforazione dell'intestino e megacolon tossico

### *Insonnia*

In Australia, il TGA ha segnalato reazioni avverse neurologiche e psichiatriche ( allucinazioni visive, confusione, depressione, e amnesia ) con Stilnox ( Zolpidem; USA: Ambien ), un ipnotico non-benzodiazepinico. Sono stati descritti casi di sonnambulismo.

### *Sovrappeso & obesità*

Reductil (Sibutramina, in USA Meridia) è stato originariamente sviluppato come farmaco antidepressivo, ed in seguito ha trovato indicazione nel trattamento dell'obesità.

La Sibutramina può causare innalzamento della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca. Il farmaco è controindicato nei pazienti con malattia coronarica, scompenso cardiaco, aritmie, o malattie cerebrovascolari. Negli Stati Uniti, il giudizio del Panel di

Tratto dalla rassegna stampa di [www.giulemanidaibambini.org](http://www.giulemanidaibambini.org)

Campagna sociale nazionale  
contro gli abusi nella prescrizione  
di psicofarmaci a bambini ed adolescenti



Esperti dell'FDA sul farmaco antiobesità Rimonabant è stato negativo: 14 voti contrari e nessun voto a favore, ma Rimonabant, con il nome commerciale Acomplia, è stato autorizzato alla vendita in Europa. I più comuni eventi avversi osservati durante trattamento con il farmaco sono di tipo psichiatrico (depressione e ansia). I pazienti che fanno uso di Acomplia appaiono associati ad un più alto rischio di suicidio.

**Fonte: Xagena Salute**